XILOCA 17
págs. 213-226
1996
ISSN: 0214-1175

LOS MAMÍFEROS EN EL ALTO JILOCA

José Mª Cereza Abadías*

Resumen.– *Repaso de los mamíferos que habitan el Alto Jiloca turolense, con la dificultad que supone su escasa presencia a la vista humana, al ser de hábitos y costumbres nocturnas.*

Se resalta por una parte, el despoblamiento de los pueblos de esta Comarca que favorece la proliferación de estos mamíferos, por otra el progresivo incremento de cazadores cuyas prácticas tienen como objetivo nuestras tierras, frenan su expansión poblacional.

Son descritos veintiseis diferentes mamíferos, indicando sus características, hábitos y lugares que frecuentan, nombres científicos y populares y la intensidad de su presencia en la zona.

Abstract.– *A review of the mammals that live in Teruel's Upper Jiloca, with the difficulty that their slight presence to the human sight implies, being of nocturnal habits and customs. It is emphasised on one side the depopulation of the towns in the region, which favours the proliferation of these mammals. On the other, the continuous increase of hunters who choose our tands for their practics testralns their population growth. Thwenty-six alfferent mammals are described, indicating their characteristics, habits, places they haunt, scientific anci popular names and the intensity of their presence in the area.*

Al intentar hacer un repaso a los mamíferos que habitan en esta parte de la geografía turolense, nos vamos a encontrar con las dificultades que siempre aparecen cuando tratamos estas especies animales: su escasa presencia a la vista humana. De todos es conocido, que los mamíferos han desarrollado unas conductas, casi nocturnas en su totalidad. Los naturalistas nos consideramos afortunados con la visión diurna de alguna especie, teniendo que recurrir la mayoría de las veces a sus hue-

* Veterinario y Naturalista.

llas, señales o rastros, para su identificación o bien por animales cazados, o tras esperas en las que hay que ostentar ganas y paciencia para poderlos ver, asegurando de este modo su presencia. También es cierto que tras muchos años de campeos y salidas a la naturaleza, ayudan a acumular la experiencia necesaria para realizar ese aludido repaso a las especies de mamíferos que pueblan estos lugares del Alto Jiloca Turolense.

Los medios naturales van a ser definitorios de cara a la correspondencia de determinadas especies con los mismos. Asimismo el progresivo, y parece ser difícil de parar, despoblamiento de los pueblos, favorece la proliferación de algunos mamíferos que en estas soledades se mueven "a sus anchas" siendo parada su expansión poblacional por la caza en unos casos o por territorialismos familiares en otros. El jabalí y el zorro encarnan unos claros ejemplos de estas proliferaciones aludidas. Siendo el bosque mediterráneo (encinares, marojales, rebollares, sabinares) el biotopo predominante en la zona de estudio, los mamíferos ligados a estos medios (erizo común, conejo, gato montés, jabalí, lirón careto...) serán los más comunes. Igualmente la presencia de roquedos, pedreras, cortados aseguraban la presencia de alguna especie como la garduña, siendo el turón y el tejón más ligados a medios húmedos como sotos, ramblas y riberas como las del río Jiloca. La estepa cerealista, muy abundante asimismo, recogerá toda suerte de micromamíferos (ratón de campo, ratón moruno, topillo común, etc.) que tan importante papel juegan en las cadenas tróficas, al ser presas de aves rapaces y otros mamíferos mayores. El ciervo se encontrará en distintos biotopos, prefiriendo los que tengan suficiente arbolado que les proporcione protección. Conviene comentar que la base de los campeos y observaciones tienen lugar en el pueblo de Ojos Negros y limítrofes, siendo aplicables las mismas a la zona del Alto Jiloca, desde Cella a Calamocha. Los nombres vernaculares, las historias, dichos, anécdotas a los que hacemos referencia, se sitúan igualmente en Ojos Negros y comarca. Veamos pues a continuación todas las especies de mamíferos que se pueden detectar en el área citada, con un poco más de detenimiento en cada una de ellas.

CIERVO (Cervus elaphus)

El ciervo en esta zona, cada vez está más presente. La cercana reserva de los Montes Universales en las poblaciones de Orihuela, Bronchales, Guadalaviar, Noguera, etc. aporta un censo de más de mil ejemplares a los que se les quedan pequeños los pinares y valles de la citada reserva.

Por los alrededores del cerro de S. Ginés, en Ródenas, Villar del Salz, la presencia del ciervo es habitual como así lo es en los rebollares de Sierra Menera, desde donde hacen incursiones sierra abajo habiéndose avistado ejemplares por la zona de las Salinas en Ojos Negros e incluso me consta que el año pasado un pastor del pueblo encontró una cuerna de ciervo en una vallejada cercana a las estepas cerealistas de las Cañadas. La escasa presencia de pinares o bosques en este pueblo hará que los ciervos no se asienten más ante la falta de esa necesaria protección vegetal en su actividad diaria amén de ser azote los pocos ejemplares que se ven de desaprensivos cazadores. De cualquier manera es una especie que va a más en el Jiloca ante la saturación poblacional en los Montes Universales, población recuperada y aumen-

tada tras un brote infeccioso de Pasteurelosis que hace unos años diezmó a los ciervos de la zona.

CORZO *(Capreolus capreolus)*

Este pequeño cérvido de costumbres todavía más esquivas que el ciervo igualmente se va asentando en algunos pueblos del Jiloca como son Villar del Salz y Ojos Negros. Se han detectado varias veces en las faldas de Sierra Menera cuyos bosques de rebollos dan buen cobijo a los corzos cuyos ejemplares deben de proceder de poblaciones muy estables en los cercanos pueblos de La Yunta, Campillo etc., en la provincia de Guadalajara. Según constatación de la guardería de COMENA el corzo ya cría con normalidad en los bosques de Sierra Menera con lo que es de esperar, una mayor presencia por toda la zona, igualmente su expansión a otros pueblos del Jiloca siempre que se vigile la presencia de escopetas a las que les gusta el atractivo trofeo de una cabeza de corzo con su característica cuerna. Ante la evidencia de peligro, el corzo mostrará su característico blanco escudo anal además de emitir un típico ladrido, hechos éstos que nos ayudarán a su identificación. De dieta eminentemente vegetal en el Sistema Ibérico consumirá con preferencia: gayuba, quejigo y robles.

JABALÍ *(Sus scrofa)*

Esta especie va a más en toda la zona del Jiloca, como es general en casi toda España, ante la despoblación de las zonas rurales y la falta de tareas forestales, pues el jabalí en la maraña o espesa vegetación se siente el rey. Las sierras a ambos lados del río Jiloca poseen abundancia de jabalíes, organizándose importantes cacerías como en el pueblo de Bueña. Por la zona de Ojos Negros se ven cada vez más (Tajadal, Sierra Menera,...) pues es zona de paso entre las sierras donde cría habitualmente. Los campos de maíz a orillas del río serán visitados muy frecuentemente por el jabalí, que igual dejará su rastro en los campos donde se siembren los conocidos tubérculos: las patatas. La caza es uno de los medios de regular las poblaciones de jabalí pues predadores naturales cuenta sólo con las grandes águilas, como es el águila real que atacará solamente a los jabatos.

GATO MONTÉS *(Felis silvestris)*

El gato montés es un perfecto cazador que muestra su gran agilidad en los bosques de encinas que constituyen su hábitat preferido. Los micromamíferos (ratones, etc.) ocupan el 48% de su dieta, los lagomorfos (conejo, liebre) el 27% y las aves el 18% siendo más ocasional la caza de insectos y reptiles. En la comarca se dice de él que "es peor que tres zorras" haciendo referencia con ello a su extremada astucia y admiración como fino cazador. En los ojeos de los zorros, se suelen abatir ejemplares y uno de los problemas de esta especie no solo aquí sino en toda España es su cruce con gatos domésticos que abundan en las parideras situadas en el monte, dando lugar a gatos cimarrones mezcla de doméstico y montés. Esta contaminación

El Gato Montés va a estar presente en los encinares del Alto Jiloca. (José M.ª Cereza).

genética es pues una de las problemáticas más acuciantes de la población salvaje de gato montés. En el Alto Jiloca va a ocupar todos los encinares localizándose en Ojos Negros sobre todo por el Tajadal, Traslabalsa, Fuente de los Villares, etc. En este pueblo se estiman unas cinco parejas, si bien muy afectadas por la caza.

TEJÓN *(Meles meles)*

Más abundantes antaño es uno de los mamíferos que parece ir a menos. De hábitos casi únicamente nocturnos, le gusta más las zonas húmedas de sotos, regatos, ramblas... no rechazando otro tipo de hábitats. Sus madrigueras son fáciles de identificar por la tierra que mueven, pues la anatomía de sus patas y uñas los convierte en perfectos zapadores. De dieta omnívora se alimenta principalmente de insectos, raíces y algún que otro micromamífero. La observación a pleno día de tejones es casi milagrosa y en todos los pueblos la gente del campo y los cazadores saben de lugares donde tradicionalmente los hay. En Ojos Negros se dan en la Fuente de la Poveda, Minguez y en el cerro El Molar.

ZORRO COMÚN *(Vulpes vulpes)*

El zorro o zorra va a ser el mamífero más emblemático de estos pueblos. Abunda, se le caza y son numerosos los dichos e historias que tienen como protagonista a la astuta zorra. Según dicen los cazadores de Ojos Negros, "habría que hacerle un

El zorro es sin duda de los mamíferos más emblemáticos en los pueblos del Jiloca. (Julio Sánchez).

monumento". En el año 95 en este pueblo se cazaron alrededor de 100 ejemplares sin menoscabo de la población pues aunque estos carnívoros son fuertemente territoriales, los territorios que quedan vacíos son ocupados por parejas que vienen de términos limítrofes pudiéndose decir que los montes de los pueblos del Jiloca, están saturados de zorros. La despoblación cada vez más acuciante y la menor presencia humana en el campo, ha favorecido el aumento de esta especie, que con casi descaro cada vez se "humaniza" más. De todos es conocido su acercamiento a los pueblos dandóse incluso casos de zorros que entran a los corrales en los mismísimos cascos urbanos. Pastores de Ojos Negros, me relataban como las zorras siguen, por la noche, sigilosas a los rebaños esperando que cuando una oveja para, pueda devorar su placenta. Igualmente los mayores de esta comarca recuerdan como antes cuando se cazaba una zorra, se pasaba casa por casa con la piel de la misma, recaudando el cazador, huevos, patatas y otros alimentos. De cría primaveral por el mes de Mayo, confieso que uno de los espectáculos más gratificantes que la naturaleza nos brinda en estas sierras es el jugueteo de los zorreznos a las puertas de su madriguera ante la mirada vigilante de su madre.

GINETA *(Genetta genetta)*

No muy abundante en la zona del Jiloca. En Ojos Negros prácticamente no se le conoce, si bien en el barrio minero de Sierra Menera se cazaron hace unos años dos ejemplares. Ágil y habilísima cazadora la gineta en sus diarias correrías de caza utili-

za unos lugares como letrinas, donde acumula sus deyecciones, pudiéndose encontrar abundantes montones de las mismas en sitios muy concretos como oquedades de roquedos. Las ginetas son escasas en los montes del Alto Jiloca, abundando poco los avistamientos y la caza de las mismas. Los bosques húmedos y sombríos con presencia de agua parecen ser los más adecuados para su hábitat disminuyendo enormemente su densidad en llanuras cerealistas y zonas más secas.

TURÓN *(Mustela putorius)*

Especie rara en el Jiloca que gusta de zonas húmedas y es escaso en las zonas secas. Conocido más por los "hurones" que paseaban por los pueblos para cazar el conejo en madriguera, casi con toda seguridad va a estar presente en los pueblos de la vega del Jiloca, como Monreal, Sta. Eulalia, Calamocha, etc. El pasado verano personalmente pude comprobar en la carretera a su paso por Luco, la presencia de un turón atropellado junto a la cuneta.

COMADREJA *(Mustela nivalis)*

La "paniquesa" que es como se le llama por estos lares, es bastante conocida por todos y constituye uno de los mamíferos que con más facilidad se puede ver de día en sus "nerviosas" correrías. Como me comentaban unos cazadores "la paniquesa hace a todo", refiriéndose que lo mismo preda un nido de pajarillo, que se mete en el

La comadreja o *paniquesa* podrá ser vista de día en sus fugaces correrías. (José M.ª Cereza).

caño de un ratón, como en el de un conejo... por esto último la llaman "hurón pequeño". No será difícil detectarla en nuestros pueblos en los que cría en agujeros de paredes, pedrizas o huecos de árboles. Para la gente es sumamente beneficiosa, quizás será porque en el Alto Jiloca no hay casi vacas, pues en otros sitios de Aragón donde se dan estos rumiantes, se teme a las comadrejas llegando a contar que dejan secas a las vacas si les muerden en las ubres. Es el carnívoro más pequeño de la fauna española y es bastante abundante en la zona del Jiloca. Su pequeño tamaño con el característico pecho blanco, la harán inconfundible para expertos y profanos.

GARDUÑA *(Martes foina)*

La garduña ni es tan conocida ni abundante como la comadreja anteriormente descrita. En el pueblo de Ojos Negros no se le conoce casi, si bien datos contrastados de la guardería del COMENA confirman su presencia en la Sierra Menera. Ligada a zonas rocosas, más que a bosques, busca en otoño e invierno el refugio de nucleos habitados dándose hechos curioso, como pude comprobar el pasado agosto, de colonización de un pueblo, Alfambra, cercano a la cuenca del Jiloca, donde las garduñas fueron la noticia del verano y otoño. Se veían de día, de noche, competían por la comida con los animales domésticos, y llegaron a criar en una casa abandonada en el centro del pueblo. Igualmente tengo noticias de la captura de un ejemplar vivo en Monreal del Campo. Destaca en su anatomía el blanco babero en un animal de 1-2,5 kg. Su dieta es omnívora (micromamíferos, gazapos, lebratos, aves diversas, insectos, reptiles) convirtiéndose en otoño principalmente frugívora.

En zonas rocosas que habitan, dejan suficientes marcas de su presencia, a través de sus defecaciones. Es de los mamíferos que posiblemente abunde más de lo que la gente y expertos creen.

ERIZO *(Erinaceus europaeus)*

El espinoso erizo va a estar presente en toda la zona del Jiloca. Va a ser un mamífero que desplega su mayor actividad en verano pues durante el invierno está sometido a un proceso de hibernación en el que su metabolismo basal queda reducido al mínimo. Muy común en los meses del estío, la imagen de los erizos atropellados por coches en las carreteras va a estar presente por doquier, siendo esa la principal causa de la mortalidad de los erizos. Para la gente, en general, son muy beneficiosos pues comen insectos y ratones que perjudican los huertos y las cosechas. Mantiene buenas poblaciones en la comarca del Alto Jiloca, donde dicen "que salen mas cuanto más llueve", "que los perros riñen con ellos" y que en general es uno de los mamíferos que mejor cae por estas tierras.

CONEJO *(Orictolagus cuniculus)*

En unos estudios sobre las densidades del conejo en la provincia de Teruel, que unos compañeros veterinarios hicieron hace unos años, el pueblo de Ojos Negros, arrojaba unas cifras que le conferían el poseer una de las mayores poblaciones de

El simpático erizo va a ser común, sobre todo en el verano. (José M.ª Cereza).

La liebre, así como el conejo, han sufrido sensibles disminuciones de población con respecto a años anteriores. (Julio Sánchez).

conejos de toda la provincia sino la que más. Muy presente antaño en todo el monte de nuestros pueblos del Jiloca, los efectivos se han diezmado, primero por la mixomatosis, luego por la VHD (Enfermedad Vírica Hemorrágica) que han dejado a este animal testimonial en muchos términos. Especie clave en la pirámide trófica del bosque mediterráneo, el conejo pasa a ser la pieza de caza por excelencia tanto de los predadores naturales (águila real, buho real, zorro) como por los cazadores. Independientemente de la presión cinegética, las poblaciones de conejo silvestre, van a estar muy relacionadas con los brotes de las enfermedades citadas.

LIEBRE (*Lepus granatensis)*

Las poblaciones de liebre, igualmente han disminuido en la zona del Jiloca. Ocupa terrenos más altos que el conejo, gustando de encamarse en los campos de cereal próximos a las parameras donde encuentran mayor protección. Especie cinegética por excelencia, soporta también una gran presión de caza. Sus predadores naturales al igual que el conejo van a ser las grandes rapaces diurnas (águila real) y nocturnas (buho real) así como el zorro. Los cazadores de Ojos Negros atribuyen su disminución a la desaparición de las viñas, siendo esto último, curiosamente, también responsable de la casi extinción de la avutarda. Existe una comprobación curiosa y constatada por varios lugareños acerca del espectro alimenticio de las liebres y es que no desprecian las carroñas. Se ha comprobado su presencia comiendo en cadáveres que habían sido previamente devorados por los buitres.

TOPO IBÉRICO *(Talpa occidentalis)*

Conocido como topo o "rata de cola corta", antes abundaba más ligado a terrenos húmedos y acequias donde cava sus galerías. Se le ve muy poco por el Alto Jiloca. Beneficioso para la agricultura por comer insectos y lombrices y airear la tierra.

LIRÓN CARETO *(Elyomis quercinus)*

En el pueblo de Ojos Negros recibe el curioso nombre de "rata murgañosa" y es una especie ligada totalmente al biotopo mediterráneo. Cría en nidos de urraca u otros córvidos, pudiendo ellos mismos construir su nido. Entran en profundo letargo durante el invierno y la gente de estas tierras, a veces los encuentran, al hacer la leña, pues tiran los chaparros en los que, quizás, los lirones caretos se encuentran ya dormidos. Se ve asimismo por las parideras diseminadas por el monte, siendo pieza codiciada por todas las rapaces. Según me cuentan en Ojos Negros su fama no es muy buena, pues la gente lo considera "algo venenoso".

RATA DE AGUA *(Arvicola sapidus)*

Se le llama topo, mucha gente del Alto Jiloca dice haberlas probado, siendo bocado exquisito. Ligada a zonas húmedas, su presencia dependerá de la existencia de aquellas.



Artilugios para la lucha contra los topillos, odiados por los azafraneros. (José M.ª Cereza).

RATA COMÚN *(Rattus norvegicus)*

Abundante en la red de alcantarillados de los pueblos, presentan a épocas explosiones demográficas propias de estos roedores. Gozan de malísima fama para las gentes de los pueblos del Jiloca y según ellos las ratas "se multiplican tras las tronadas de verano".

RATA CAMPESTRE *(Rattus rattus)*

De presencia más montaraz que la rata común, se le llama en general rata negra en recuerdo de aquella terrible "peste bubónica" de la Edad Media que tanto diezmó a la población humana y que asimismo afectaba a la rata. Es depredada por rapaces, lagartos y carnívoros, siendo los gatos de nuestros pueblos los principales enemigos de las ratas junto con el odio atávico y hereditario que se profesan a las ratas, en todos nuestros pueblos.

RESTO MICROMAMÍFEROS

Ratón moruno (Mus spretus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Ratón casero (Mus musculus), Topillo común (Pitymys duodecimcostatus), Musaraña (Crocidura russula) y Musarañita (Suncus etruscus).

El ratón de campo es pieza clave en la alimentación de rapaces diurnas y nocturnas.
(José M.ª Cereza).

En este grupo vamos a englobar a toda la serie de "ratillas", "ratones" que pululan tanto en el campo como en los pueblos. El topillo común o "ratón de cola corta" que es como se le conoce por el Jiloca, es el temido ratón del azafrán al que hay que combatir, pues se come la cebolla de este típico cultivo. Conocido por todos los azafraneros (cada día quedan menos) aún se siguen utilizando artilugios y artimañas para combatirlos. Así los fuelles y pucheros se ensamblan para ahumar las galerías excavadas por los topillos en los campos de azafrán, favoreciendo el abandono de sus nidos y pasadizos. Al ratón de campo lo denominan "ratón de cola larga" para diferenciarlo del odiado topillo. A la musaraña la llaman "bocaraña" y dicen se encuentra sólo en el campo, y finalmente resaltaremos a la musarañita, mamífero más pequeño que existe en el mundo con una longitud de 3-5 cm., cabeza y cuerpo, desconocida aunque el pasado verano pude constatar su existencia tras arrebatársela a un gatito que jugaba con ella en el pueblo de Ojos Negros. Los micromamíferos son un eslabón importante en la alimentación de muchos mamíferos antes citados y de muchas rapaces diurnas y nocturnas por lo que en su labor de limpieza de estas "plagas ratoniles" es incomprensible la mala fama que en algunas personas perdura acerca de los alcotanes, cernícalos, lechuzas, mochuelos, etc.

MURCIÉLAGOS

Un repaso sistemático a todos los mamíferos de estas tierras turolenses, quedaría cojo, sin citar al menos, la presencia de los enigmáticos y desconocidos murciélagos.

La musarañita y la musaraña son de los micromamíferos menos conocidos. (José M.ª Cereza).

Su identificación es complicada de no cogerlos en mano o con macrofotografía, por lo que en teoría y según guías de consulta, hasta quince especies diferentes se pueden dar en esta zona, aunque su enumeración sería prolija y en algún caso no del todo cierta. Constataremos de todas las maneras, la segura presencia del "orejudo común", "rinolofo pequeño" y "murciélago común" entre otras especies. Iglesias, ermitas, cuevas y casas de campo son lugares de su reposo diurno, siendo por la noche, sobre todo en el verano, cuando su presencia en nuestros pueblos se hace notar cerca de los puntos de luz emitiendo unos curiosos reclamos y capturando los numerosos insectos que le sirven de alimento.

No me gustaría terminar esta pequeña revisión de los mamíferos del Alto Jiloca, sin citar dos emblemáticas especies ¿ausentes? de nuestras sierras y montes, pero rodeadas de miedos, misterios y admiración... me refiero al lobo (Canis lupus) y al lince (Lynx pardina). El lobo campó hace ochenta años por estas tierras y los más viejos del lugar aún recuerdan historias y ataques a rebaños de ovejas. Se dice de él que tanto se le persiguió que se extinguió. Todos los mapas de distribución actuales de mamíferos en España lo consideran ausente de esta zona aunque se crea que hay.

Es difícil que en el Alto Jiloca haya lobos, salvo algún individuo errático, que se acerque por estos lares y pueda realizar alguna fechoría. Los ataques veraniegos de estos años atrás a rebaños en Peracense, Ródenas, Almohaja, más propias parecen de perros asilvestrados que de lobos, si bien para la gente son fieras, lobos, mitad lobo mitad zorro, o vaya Vd. a saber. De todas la maneras, sin su captura cualquier

especulación es válida. Del lince, con distribución actual muy al Sur de la provincia de Teruel, igualmente existen historias y supuestos avistamientos. Parece ser que en un pueblo cercano a la zona del Jiloca se cazó hace años uno y la gente al hablarle del lince lo describen como un "gatazo" de cola corta, barbas y pelillos en las orejas (descripción que me hizo un veterano cazador de Ojos Negros). En definitiva, biotopos y lugares adecuados no les faltan tanto al lobo como al lince en la zona del Jiloca, favoreciéndoles además la progresiva despoblación de estas tierras. Si bien científicamente y observando sus actuales mapas de distribución en la Península Ibérica, resulta extraña su presencia, sus supuestas apariciones u observaciones son enigmáticas y rodeadas de misterio.

MAMÍFEROS

Nombre	Nombre científico	Nombre en Ojos Negros (comarca)	Presencia en la zona
Ciervo	Cervus elaphus	Ciervo	Cada vez más presente
Corzo	Capreolus capreolus	Corzo	Cada vez más presente
Jabalí	Sus scrofa	Jabalí	Abundante
Gato montés	Felis silvestris	Gato montés	Común
Tejón	Meles meles	Tajugo/tajudo	Común
Zorro	Vulpes vulpes	Zorro/zorra	Muy abundante
Gineta	Genetta genetta	Gineta	Escaso
Turón	Mustela putorius	Hurón	Raro
Comadreja	Mustela nivalis	Paniquesa	Abundante
Garduña	Martes foina	Güina	Escaso
Erizo	Erinaceus europaeus	Erizo	Abundante
Conejo	Orictolagus cuniculus	Conejo	Menos abundante que antes
Liebre	Lepus granatensis	Liebre	Menos abundante que antes
Lirón careto	Elyomis quercinus	Rata murgañosa	Menos abundante que antes
Topo ibérico	Talpa occidentalis	Topo	Escaso
Rata de agua	Arvicola sapidus	Topo/rata de agua	Abundante
Rata común	Ratus norvegicus	Rata	Muy abundante
Ratón moruno	Mus spretus	Ratón	Muy abundante
Ratón de campo	Apodemus sylvaticus	Ratón de cola larga	Muy abundante
Ratón casero	Mus musculus	Ratón	Muy abundante
Topillo común	Pitymys duodecimcostatus	Ratón de cola corta	Muy abundante
Musaraña	Crocidura russula	Bocaraña/murgaño	Muy abundante
Musarañita	Suncus etruscus	Bocaraña	Escaso
Murciélago	Generos rinolophus, pipistrellus	Murciélago	Común
Lobo	Canis lupus	Lobo	¿?
Lince	Lynx pardina	Lince	¿?

BIBLIOGRAFÍA

NATURALEZA DE ARAGÓN: SU FAUNA Y SU FLORA. Varios autores. "El Periódico de Aragón", 1994.

GUÍA DE LOS MAMÍFEROS EN LIBERTAD DE ESPAÑA Y PORTUGAL. Álvaro Castells y Manuel Mayo. Ed. Pirámide, 1993.

GUÍA DE CAMPO DE LOS MAMÍFEROS SALVAJES DE EUROPA OCCIDENTAL. P. Barruel Vanden Brunk. Ed. Omega, 1971.

REVISTA XILOCA. Número 12, 14.

ENCICLOPEDIA FAUNA IBÉRICA. Salvat Editores, 1977.

Quiero manifestar mi agradecimiento a Julio Sánchez, guarda del COMENA de Monreal del Campo y a Javier Ruiz de Ojos Negros, expertos naturalistas de la zona con los que he contrastado observaciones y me han aportado datos, así como a Manolo García, Rufino Fogued y Pedro Villen, veteranos cazadores de Ojos Negros con los que mantuve una larga conversación y me aportaron numerosas historias, anécdotas y dichos acerca de los mamíferos en el pueblo de Ojos Negros y comarca.